

Tekst: Birte Hegerlund Runde **Foto:** Anne Karin Andersen

Pest og plage for pus

Det har oppstått en lei kattepine i Arendal med flere tilfeller av pest. Denne uken ble 40 katter vaksinert hos Dyrebeskyttelsen på Kverve gård i Froland.

Vi har nettopp konstatert kattepest i Arendalsdistriktet. Dette er en alvorlig smittsom sykdom hos katt som ofte er dødelig, spesielt hos unge uvaksinerte katter. Dette retter fokus på hvorfor vaksinering av hund og katt er så viktig, sier dyrlege Solvejg Kna-genhjelm ved Agder Dyreklinikk.

Sammen med kollega Camilla Lilleholt er hun ute hos Dyrebeskyttel-

sen i Aust-Agder på Kverve i Froland for å beskytte kattene mot pesten som har brutt ut.

Vanlig i Norge. Dyrlegene kan fortelle at kattepest er relativt vanlig i Norge. Sykdommen kan være dødelig og forårsakes av et parvovirus. Viruset er svært overlevelsedyktig utenfor vertedyret og smitten spres både ved direkte kontakt mellom katter og indirekte via omgivelsene. I katten vil særlig de hvite blodlegemene bli angrepet, men også tarmceller og nerveceller kan infiseres.

– Katter med klassisk akutt kattepest har symptomer som buksmerter, feber, diaré, tap av matlyst, nedstemthet og oppkast. De kan ofte dø før de viser noen av disse symptomene. Sykdommen er spesielt farlig for kattunger, men også eldre katter kan bli syke, informerer Solvejg.

– Hvordan kan en hindre smitte?
– Det er nok spesielt villkatter som sprer kattepestviruset. Enkelte dyr kan være bærer av viruset uten å bli



Et stikk og pus går en sikker fremtid i møte mot den farlige pesten. Dyrlegene Solvejg

spesielt syke av den selv. På den måten kan de skille ut virus og spre smitte over mange år. Vi har dessverre et stort antall villkatter som går rundt i hele Arendalsdistriktet, sier Solvejg.

Den vanlige årlige kattevakسينen beskytter mot sykdommen, hevder dyrlegene. Vaksinen må tas to ganger med tre-fire ukers mellomrom og gir beskyttelse i opptil tre år.

Kattunger vaksineres første gang

når de er ca. 12 uker gamle. Deretter ny dose 3–4 uker senere. Da er katten grunnvaksinert. Deretter skal man vaksinere årlig.

Det er debatt om vi overvaksinerer i dag. Vaksinen mot «katteinfluensa» har beskyttelse bare i et år, mens vaksiner mot kattepest har beskyttelse i tre år. Vaksine mot «katteinfluensa» og kattepest er en kombinasjonsvaksine, derfor blir katter i dag vaksinert hvert år.





Knagenhjelm og Camilla Lilleholt hadde det travelt med å stikke alle 40 kattene på Kverve i Froland.

Viktig vaksine. – Hvorfor er det viktig å gi kattene vaksine?

– Vaksinerer er en viktig, billig og effektiv måte å forhindre sykdom på. Flere av de sykdommene vi vaksinerer for finnes det ingen effektiv behandling mot. Årlig revaksinerer av hunder og katter har ført til at vi i Norge har et lavt smittepress på alvorlige sykdommer som er vanlig i andre land. Det er derfor viktig at vi fortsetter å vaksinere og dermed får friskere dyr og lite smitte, hevder Solvejg.

KONTAKT OSS

Har du dyrespørsmål du ønsker å få svar på i denne spalten eller bilder av deg og kjæledyret ditt, skriv til

dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!



Solvejg Knagenhjelm

Camilla Lilleholt

Hva vaksineres det mot?

Parvovirus (hund), Smittsom leverbetennelse (hund), Valpesyke (hund), Kennelhoste (hund), Kattepest (katt), Herpes og calicivirus og Chlamydia kan hunder og katter vaksineres mot.

Valper vaksineres første gang ved 12 ukers alder. Enkelte oppdrettere vaksinerer i tillegg valpene ved 8 ukers alder, før de leveres. I de fleste tilfeller er ikke dette egentlig nødvendig, da valpene fortsatt har antistoffer fra mora. Den viktigste er ved 12 uker. Deretter skal hunden vaksineres når den er ett år gammel. Etter dette anbefales årlig revaksinerer mot kennelhoste, mens man vaksinerer hvert 3. år mot parvo, smittsom leverbetennelse og valpesyke.

Tisper som skal avles på vaksineres før parring eller i begynnelsen av drektigheten, slik at valpene får mest mulig beskyttelse gjennom morsmelken.

Kattunger vaksineres første gang når de er ca. 12 uker gamle, Deretter ny dose tre-fire uker senere. Da er katten grunnvaksinert. Deretter skal man vaksinere årlig. Det er debatt om vi overvaksinerer i dag. Vaksinen mot «katteinfluensa» har beskyttelse bare i et år, mens vaksiner mot kattepest har beskyttelse i tre år. Vaksine mot «katteinfluensa» og kattepest er en kombinasjonsvaksine, derfor blir katter i dag vaksinert hvert år.

Til voksne katter (over to år), som ikke har blitt vaksinert tidligere, holder det med én vaksine som grunnvaksine, deretter hvert år, om smittepresset i miljøet ikke er for stort.

Bare friske dyr skal vaksineres.
Hilsen Solvejg

Jeg har en bichon frise på to år som klør så den biter seg til blods. Vi har vært gjennom en lang liste hos veterinæren uten at vi har funnet ut av den. Det siste er et fôr som er helt rent. Dette har hun gått på i nesten 8 uker i tillegg til kortison og

penicillin. Penicillin fordi hun fikk betente sår. Når vi sluttet på kortison tok det bare noen dager før kløingen og bitingen kom tilbake. Dette må vel bety av problemet ikke kommer fra fôret?

Utredning av en kløepasient hos dyrlege er en prosess som nødvendigvis går over flere trinn. Vanligste er å først utelukke parasitter i pels og hud, deretter å ekskludere fôrallergi. Dette gjøres ved å sette hunden på en åtte ukers kur med et spesielt fôr med hydroliserte proteiner. Siden det i fôret er proteinene man kan utvikle allergi overfor, vil det å fjerne disse i fôret, kunne utelukke fôrallergi som årsak til kløeproblemet.

Ofta må man samtidig behandle bakterielle infeksjoner og eventuelt soppinfeksjoner som oppstår på grunn av ubalansen i huden mens utredningen pågår. Dette gjøres ved hjelp av ulike antibakterielle midler og midler som virker mot sopp.

Diagnosen Atopi er en ekskluderingsdiagnose. Det vil si at når man kan utelukke fôrallergi, parasitter, bakterielle infeksjoner og lignende som årsak til kløen tar man en blodprøve som sjekker mot antistoffer i blodet. Der som hunden har slike antistoffer i blodet betyr det at den er allergisk mot noe den puster inn.

I og med at din hund allerede har vært gjennom en del av denne utredningen og blir bedre av å dempe immunsystemet med kortison/prednisolon har jeg en sterk mistanke om at dette kan dreie seg om atopi.

Jeg anbefaler deg sterkt at du på nytt oppsøker veterinær og får hunden din ferdigutredet med hensyn til dette. Av erfaring blir en atopiker sjeldent helt bra av seg selv, selv om intensiteten på symptomene for eksempel kan ha sesongvariasjoner. Som regel kreves behandling med for eksempel immunisering, fetttsyretilskudd, behandling med antihistaminer, atopika eller liknende.

Hilsen Camilla